

# Recomendación para la vacuna contra el sarampión (triple viral o MMR)

NIÑOS	RECOMENDACIONES
De 12 a 15 meses	Los niños de 12 a 15 meses deben recibir su primera dosis de la vacuna MMR. <i>*Los niños de 6 a 11 meses pueden recibir la vacuna MMR en algunas situaciones. Vea la siguiente información para obtener detalles.</i>
De 4 a 6 años	Los niños de 4 a 6 años deben recibir su segunda dosis de la vacuna MMR. (Después de esta dosis, ellos tendrán la vacuna completa contra el sarampión). <b>NOTA:</b> Si un niño no recibe su primera dosis, debe recibir dos dosis de la vacuna MMR por lo menos con 28 días de distancia para ponerse al día.
De 7 a 18 años	Los niños mayores de 7 años que no tienen la vacuna completa deben recibir dos dosis de la vacuna MMR. <b>NOTA:</b> Si un niño no recibe su primera dosis, debe recibir dos dosis de la vacuna MMR por lo menos con 28 días de distancia para ponerse al día.
<p><i>*Los niños de 6 a 11 meses pueden recibir la vacuna MMR si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Han estado expuestos al sarampión</li> <li>• Viven en una zona de brotes; o</li> <li>• Están viajando internacionalmente a una región con casos de sarampión.</li> </ul> <p>Los niños que reciben la dosis de la vacuna MMR antes de los 12 meses deben recibir dos dosis más después del programa de vacunación recomendado anteriormente. Los padres o tutores deben hablar con el proveedor de atención médica para obtener más información.</p>	
ADULTOS	RECOMENDACIONES
Nacidos antes de 1957	Los adultos nacidos antes de 1957 se consideran inmunes.
Nacidos de 1957 a 1967	Los adultos nacidos entre 1957 y 1967 son inmunes si ya tuvieron sarampión.  Si no han tenido sarampión, deben considerar recibir una dosis de la vacuna MMR porque en los años 60 se utilizó una vacuna menos efectiva.
Nacidos después de 1967	Los adultos nacidos después de 1967 se consideran inmunes si han recibido uno o dos dosis de la vacuna o si ya tuvieron sarampión.
<i>Si se desconoce el estado de vacunación, es mejor recibir una dosis adicional de la vacuna MMR.</i>	
Embarazo	Las mujeres embarazadas no deben recibir la MMR.
Sistema inmunitario débil	Las personas con un sistema inmunitario débil deben hablar con su proveedor de atención médica acerca de la vacunación.

Llámenos al **316-660-7300** para programar una cita para cubrir todas sus necesidades de vacunación.

Fuente: <https://www.cdc.gov/measles/hcp/vaccine-considerations/index.html>



SEDGWICK COUNTY  
**Health Department**

